



Ceftion Aguda

Antibiótico, antimastítico

Fórmula farmacéutica

Antibiótico intramamario para el tratamiento de mastitis ambientales.

Composición

Ceftiofur clorhidrato: 100 mg. Cefalexina monohidrato: 100 mg. Prednisolona 5 mg. Vehículo c. s.p. 5 g.

Indicaciones

Tratamiento de mastitis producidas por microorganismos sensibles a la cefalexina, ceftiofur o su combinación, durante la lactancia.

Agentes etiológicos susceptibles: Ceftiofur: *Staphylococcus aureus*; *Streptococcus dysgalactiae*; *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus uberis*, *Escherichia coli*. Cefalexina: *Staphylococcus aureus*; *Streptococcus agalactiae*; *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis*; *Streptococcus spp.*; *Corynebacterium spp.*; *Escherichia coli*; *Klebsiella pneumoniae*, *Proteus mirabilis*.

Contraindicaciones y advertencias

No administrar en animales previamente reconocidos como hipersensibles a algunos de los principios activos y/o excipientes del producto. No exceder las dosis propuestas.

Verificar que el sistema de inviolabilidad del producto y sus condiciones de almacenamiento previo a su uso sean las adecuadas, así como que el mismo no haya caducado en referencia a la fecha de vencimiento expresada en el rótulo.

Dosificación

Aplicar una jeringa por cuarto mamarlo cada 24 horas. Se recomienda un mínimo de dos dosis. Forma de aplicación: Intramamaria.

Previamente a la aplicación, extraer en lo posible la totalidad de la leche en el cuarto a tratar, lavar y desinfectar, luego secar cuidadosamente.

Introducir el contenido completo de una jeringa a través del conducto galactóforo. A fin de favorecer la difusión del producto, es conveniente dar un ligero masaje ascendente luego de la administración.

Especie de destino

Bovino.



Restricciones de uso

Tiempo de retiro pre-faena: 4 días.

Tiempo de retiro pre-ordeño: 48 horas.

La intoxicación con este producto no puede producirse por manipulación del mismo, únicamente por ingestión accidental.

En este caso se recomienda llamar inmediatamente al médico.

No existe antídoto, aplicar tratamiento sintomático.

Conservación

Conservar al abrigo de la luz entre 8 y 25 °C.

Presentación

Caja por 12 jeringas de 5g.