

ANTIBIÓTICO



Biomacrotil 200

Antimicrobiano. Antimicoplásmico.

Forma farmacéutica:

Solución antibiótica inyectable a base de Tilosina.

Composición

Tilosina 20 g. Excipientes c.s.p. 100 ml.

Indicaciones

Bovinos: Complejo respiratorio bovino, generalmente asociado con *Pasteurella multocida* y *Corynebacterium pyogenes*, neumonía, bronquitis, difteria, metritis. Porcinos: Artritis, neumonía, Disentería porcina. Perros: Infecciones respiratorias (bronquitis, traqueobronquitis, traqueítis, laringitis, tonsilitis, neumonía); leptospirosis; otitis. Gatos: Enfermedades respiratorias. Indicado en general en infecciones producidas o complicadas por los siguientes gérmenes sensibles a la Tilosina: *Mycoplasmas* spp, *Espiroquetas*: *Serpulina hyodisenteriae*, *Leptospira* spp; *Chlamydia* spp; bacterias Gram (+): *Staphylococcus* spp, *Streptococcus* spp, *Erysipelotrix rhusiopathiae*, *Corynebacterium pyogenes*, *Clostridium* spp; bacterias Gram (-): *Fusobacterium necrophorum*; *Pasteurella* spp, *Bordetella bronchiseptica*

Especies de destino

Bovinos, porcinos y aves.

Dosificación y vía de administración

Bovino: 0,5 ml de BIOMACROTIL 200/10 kg p.v., cada 24 horas durante 3-5 días. Cuando se administre más de 10 ml, repartir la dosis en distintos puntos de inoculación. Porcino: 0,5 ml de BIOMACROTIL 200/10kg p.v., cada 12 horas durante 3 días. Cuando se administre más de 5 ml, repartir la dosis en distintos puntos de inoculación. Canino y felino: 0,5 ml de BIOMACROTIL 200/10 kg p.v., cada 24 horas durante 3-5 días.

Aplicación

Administrar por vía intramuscular.

Contraindicaciones

No administrar conjuntamente con antibióticos bactericidas. Es incompatible con Estreptomina, Hidrocortisona, sulfamidas y tetraciclinas.



Tiempo de retiro

Carne: 21 días. Leche: 4 días.

Presentación

Frasco 250ml.