



# NEUMOFLOR ORAL

## FORMA FARMACÉUTICA:

Antibiótico de amplio espectro de uso oral para aves y cerdos.

## COMPOSICIÓN:

Florfenicol 10 g. Bromhexina 0,26 g.  
Agentes de formulación c.s.p. 100 ml.

## INDICACIONES:

Tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas producidas por microorganismos sensibles al principio activo Florfenicol, principalmente procesos infecciosos respiratorios.

## DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar por vía oral en el agua de bebida. Aves, clima frío: diluir 200 ml en 100 l de agua. Clima caluroso diluir 100 ml en 100 l de agua. Dosis estimada: Florfenicol: 20 mg/kg; Bromhexina: 0,5 mg/kg. Duración 3 a 5 días. Intervalo entre dosis: 24 horas. Cerdos: Diluir 200 ml del producto en 100 l de agua. Dosis estimada: Florfenicol: 20 mg/kg; Bromhexina: 0,5 mg/kg. Esta dosificación es aproximada, pudiendo variar de acuerdo al tipo de alimento, temperatura y humedad ambiental, y categoría de animales entre otras causas. Se recomienda restringir el acceso al agua de bebida de los animales previamente a su administración para asegurar el total consumo del agua medicada.

## CONTRAINDICACIONES:

No administrar en aves hipersensibles a alguno de los principios activos. No combinar en el agua de bebida con antibióticos bactericidas como las penicilinas.

## TIEMPO DE RETIRO:

No utilizar en aves productoras de huevos destinados al consumo humano.

## PRESENTACIÓN:

Botella de 1 lt.

