



CALIERCLOR 20% PREMIX

FORMA FARMACÉUTICA:

Antibiótico en polvo uso oral.

COMPOSICION:

Premezcla granulada para uso oral de Clortetraciclina complejo de calcio que contiene 20% de Clortetraciclina Clorhidrato.

INDICACIONES:

Porcinos: Enteropatía proliferativa porcina (ileitis), enteritis bacterianas, Disentería porcina.

Enfermedad de los edemas del cerdo, diarreas post-destete, Rinitis atrófica, Neumonía enzoótica porcina, pleuro neumonía. Leptospirosis.

Pollos parrilleros, recria de ponedoras y reproductores, Pavos: Cólera aviar, Coriza infecciosa aviar, Colibacilosis. Salmonelosis aviar, Pullorosis, Enfermedad crónica respiratoria, Aerosaculitis, Sinovitis infecciosa. En pavos además: Hexamitiasis, Sinucitis infecciosa, infecciones bacterianas asociadas a la enfermedad de la cresta azul.

Terneros: infecciones entéricas, respiratorias y septicémicas producidas por cepas sensibles a la clortetraciclina, de *Escherichia coli*, *Salmonella* spp., *Pasteurella* spp y *Mycoplasma bovis*.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION:

Dosis de referencia: 20 a 22 mg/kg de Peso Vivo.

Porcinos y Aves: 1 a 2 kg de Calierclor 20 % Premix por tonelada de alimento. Administrar cada 24 horas de 3 a 5 días.

CONTRAINDICACIONES:

Antiácidos, suplementos de hierro, bicarbonato de sodio administrados en forma concurrente pueden disminuir la absorción de Clortetraciclina oral.

Efectos colaterales: Puede presentarse decoloración de los dientes en animales jóvenes si se administra durante los últimos meses de la preñez o durante el período de desarrollo de los dientes. De presentarse reacciones de hipersensibilidad suspender el tratamiento y administrar epinefrina, corticoides y/o antibióticos.

TIEMPO DE RETIRO:

Tiempo que debe transcurrir entre el último día del tratamiento y del sacrificio del animal para consumo humano: Porcinos = 10 días. Aves = 7 días.

No administrar a aves ponedoras si los huevos se destinarán a consumo humano.

PRECAUCIONES:

Se debe preparar primero una premezcla con 5 a 10 kg de alimento y luego agregar esta premezcla a la ración.

Controlar bien el mezclado al agregar el producto.

El alimento medicado no utilizado en el plazo de 24 horas, debe ser desechado.

El producto no resulta tóxico ni perjudicial para el hombre. Puede causar irritación de la membrana mucosa, cutánea y ocular. El producto deberá ser utilizado con precaución impidiendo el contacto y la inhalación en el momento de su preparación. Emplear guantes y mascarilla durante su manipulación.

Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

PRESENTACION:

Bolsa por 25 kg.