

ANTIBIÓTICO



Biomacrotil Premix

Antibiótico en polvo uso oral.

Composición

Cada 100 g contiene: Tilosina fosfato 8.8 g; Excipientes c.s.p.

Indicaciones

Biomacrotil Premix, es un antibiótico bacteriostático a dosis usuales y bactericida a dosis elevadas, indicado para el tratamiento de procesos infecciosos causados por gérmenes sensibles a la Tilosina.

Aves: Enfermedad crónica respiratoria, Sinovitis infecciosa.

Porcinos: Rinitis atrófica, Neumonía enzoótica, Disentería porcina, Enteropatía proliferativa porcina - lleítis -.

Bovinos: Complejo respiratorio bovino. Piétin. Reducción de la incidencia de abscesos hepáticos causados por *Actinomyces pyogenes* y *Fusobacterium necrophorum*.

Especies de destino

Bovinos, porcinos y aves.

Dosificación y vía de administración

Aves: (Pollos parrilleros, aves de reemplazo, reproductoras): 9 a 12 kg de Biomacrotil Premix por tonelada de alimento.

Porcinos: 1,25 kg de Biomacrotil Premix por tonelada de alimento.

Bovinos: 0,125 kg de Biomacrotil Premix por tonelada de alimento.

Para calcular la dosis, las raciones para bovinos de carne que contengan ensilaje u otros ingredientes húmedos, deberán ser corregidas con un contenido de 90 % de materia seca.

Administrar cada 24 horas, durante 3 a 5 días. El producto debe ser mezclado en el alimento, preparando una premezcla con 5 kg del mismo. Luego agregar la premezcla a la ración. El producto debe ser preparado diariamente y utilizado dentro de las 24 horas de preparado. Debe asegurarse un mezclado homogéneo con el alimento. El alimento medicado será la única ración durante los días que dure el tratamiento. Al final del tratamiento el sistema para suministro de alimento debe ser limpiado adecuadamente a fin de evitar la ingestión de cantidades restantes.

Contraindicaciones

No administrar conjuntamente con Cloranfenicol, Florfenicol, Lincosamidas y otros antibióticos macrólidos.

Tiempo de retiro

Bovinos, Porcinos, Pollos parrilleros, aves de reemplazo, reproductoras: 5 días.



Precauciones

En las dosis indicadas no se conocen efectos tóxicos. La sobredosificación de lechones puede ocasionar reacciones adversas, shock y muerte. La ingestión por personas medicadas con glucósidos digitálicos puede causar un incremento de los niveles sanguíneos de los mismos. Como algunos componentes del producto pueden causar irritación en piel y mucosas, el mismo deberá ser empleado con precaución evitando el eventual contacto.

Presentación

Bolsa de 25 kg.