



Cloxacum Sell

Sello interno con color

Composición

Cada 100 g contiene:
Subnitrato de bismuto 61,3 g, Óxido de zinc 5 g, Excipientes c.s.p 100 g.

Indicaciones

El producto está indicado en vacas lecheras en la prevención de nuevas infecciones intramamarias a lo largo del período seco. Actúa creando una barrera dentro del canal del pezón, evitando así el ingreso de microorganismos a través de dicha vía. La acción del producto es netamente mecánica, ya que no contiene antibióticos ni quimioterápicos.

Vía de administración

Intramamaria.

Dosificación

Aplicación preventiva: Aplicar en forma intramamaria una jeringa en cada cuarto inmediatamente después del último ordeño en la lactación (en período seco). Administrar el contenido de una jeringa (4 g) en el canal de cada pezón de cada cuarto mamario inmediatamente después de la aplicación de un antibiótico intramamario de secado. Se recomienda una buena limpieza y desinfección de cada pezón previo a su administración. No masajear el pezón ni la ubre después de su aplicación. Es aconsejable desinfectar apropiadamente el pezón luego de su administración. Deben tratarse todos los pezones de cada ubre. El producto permanece en el canal del pezón lo que dura el período seco.

Contraindicaciones

La utilización de este producto está limitada al momento de secado. No utilizar en vacas con sospecha o confirmación de infección intramamaria.

Especie de destino

Bovino.

Precauciones especiales para su utilización

Se recomienda una buena limpieza y desinfección de cada pezón previo a su administración. No masajear el pezón ni la ubre después de su aplicación. Es aconsejable desinfectar apropiadamente el pezón luego de su



administración. Se aconseja la aplicación de un antibiótico para secado previo a la administración del producto. No remover el producto por la acción de la máquina ordeñadora. Se recomienda despuntar los pezones exhaustivamente (10 a 12 chorros de cada cuarto) antes del primer ordeño del ciclo de lactancia, con el fin de evitar la acumulación del producto en las máquinas ordeñadoras. Al despunte su colorturquesa flúor nos va a permitir comprobar la persistencia del producto durante todo el periodo seco. Si el producto es administrado accidentalmente a una vaca lactante, se podrá eliminar despuntando el pezón manualmente.

Periodo de retiro

Carne: 0 días; Leche: 0 días.

Conservación

Consérvese en su envase original, en lugar seco, fresco y protegido de la luz solar directa, entre 15 °C y 25 °C.

Presentación

Caja de 24 y 120 jeringas de 4 g.