



# Calcio-Calier Forte

Solución inyectable estéril

## Composición

Borogluconato de Calcio (aporta 4,6 g de Calcio) 55,28 g., Cloruro de Magnesio Hexahidratado (aporta 0,768 g de Magnesio) 6,43 g., Hipofosfito de Magnesio Hexahidratado (aporta 0,031g de Magnesio y 0,08 g de Fosforo) 0,338 g., Excipientes C.S.P. 100 mL.

## Indicaciones

Suplemento preventivo terapéutico - Minerales. Hipocalcemia aguda, Incluyendo la paresia puerperal de la vaca.

## Especies

Bovinos.

## Dosis

Administrar 7,5 mg -22,5 mg de Calcio por kg de p.v. (equivalente a 0,16 ml – 0,49 ml de Calcio Calier Forte/kg de p.v.), según la gravedad del proceso.

## Contraindicaciones

No administrar a animales hiperexcitados, ya que puede ocurrir muerte repentina.

## Incompatibilidades e interacciones

No administrar con tetraciclinas, sulfato de magnesio, bicarbonato sódico y sulfato de estreptomicina y de dihidroestreptomicina. No administrar junto con glucósidos cardiotónicos.

## Efectos secundarios

La inyección subcutánea puede causar necrosis en el punto de inyección. Se puede producir bradicardia e incluso paro cardíaco si la inyección intravenosa es rápida.

## Precauciones especiales para su utilización

La inyección intravenosa debe realizarse muy lentamente (6-10 minutos), templando previamente la solución. Simultáneamente a la administración intravenosa, se debe realizar una auscultación cardíaca; si se desarrollan disritmias o bradicardias graves, debe suspenderse la administración hasta que el latido del corazón vuelva a la normalidad.

Cuando se administra en vía SC, se repartirá en varios puntos de inyección (un máximo de 25 ml por punto de aplicación).



## Sobredosificación

No exceder la dosis recomendada. En casos de sobredosis, puede manifestarse arritmia cardíaca, bradicardia y coma. Puede provocarse un bloqueo cardíaco irreversible.

## Período de retiro

Pre-faena: 0 días. Pre-ordeño: 0 horas.

## Conservación

Conservar entre 15-25°C al abrigo de la luz solar directa.