

eligí dar en



la **D**iana.

YODIMASPEN

penetamato iohidrato

**Máxima acción y concentración
donde usted más la necesita**

-  Primera elección frente a mastitis por Gram (+) no productores de beta-lactamasas.
-  Formulado para alcanzar altas concentraciones en leche.
-  Antibiótico bactericida tiempo dependiente.
-  Por un uso prudente y responsable de los antibióticos

YODIMASPEN

Eficacia excepcional en el foco de la infección.



El penetamato iohidrato, es un profármaco que libera Bencilpenicilina (Penicilina G) en la glándula mamaria.

- Idóneo para el tratamiento de infecciones producidas por bacterias sensibles a la Bencilpenicilina.
- Formulado para alcanzar altas concentraciones en leche (hasta 4 veces más que otras penicilinas) y facilitar rápidamente la cura clínica y bacteriológica.




Yodimaspen contiene penetamato iohidrato molécula clasificada de primera elección (categoría **D**) por la agencia Europea del Medicamento

Concentraciones de penicilina en U.I / ml, en leche después de su administración i.m



En la glándula mamaria, el Penetamato sufre 'bloqueo iónico'



COMPOSICIÓN: Penetamato iohidrato 5 g (Equivalentes a 5.000.000 UI de bencilpenicilina). Vehículo acuoso, c.s.p. 15 ml.

INDICACIONES: Tratamiento de procesos infecciosos causados por microorganismos sensibles a la bencilpenicilina. Resulta indicado en: Mastitis estreptocócicas y estafilocócicas, infecciones del aparato respiratorio, infecciones secundarias originadas por la fiebre del transporte, infecciones uterinas, pododermatitis, listeriosis.

POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN: Vía intramuscular a las siguientes dosis: **Mastitis:** Vacas: 1 vial/vaca y día, repetir a las 24 hs. Cerdas, ovejas: 1/2 vial. Otros procesos infecciosos: 0,3 - 0,5 ml de producto reconstituido / 10 Kg de p.v. La medicación se prolongará hasta pasadas 24-48 horas de la remisión total de la sintomatología. Si a la 48 horas de iniciada la medicación no se observa una manifiesta mejoría del animal, reconsiderar el diagnóstico y el tratamiento.

CONTRAINDICACIONES: No administrar a animales con historial de hipersensibilidad a las penicilinas. Debe tratarse con especial atención a los animales con historial conocido de alergia a la cefalosporinas.

TIEMPO DE ESPERA: Carne: 7 días. Leche: 3 días.

Recuerda seguir un manejo adecuado



Identifica la vaca con marmitas y sepárala del resto



Elegir el tratamiento en base al cultivo bacteriano con antibiograma



Determina el peso de la vaca para aplicar la dosis adecuada y evita subdosificar



Ordenarla por separado y descartar su leche



Extremar las medidas higiénico-sanitarias en todo momento

Compromiso con Una Sola Salud
La conexión entre



CALIER
SOSTENIBILIDAD
EN SALUD ANIMAL

LABORATORIOS CALIER
DE ARGENTINA, S.A.

Maturin 2745 (C1416CTM)
Capital Federal - Buenos Aires
Argentina. Tel./Fax: (011) 4582-8668

WWW.CALIER.COM.AR
WWW.CALIER.NET