



ZIPYRAN®

Sabor



Ref. 303020-002

USO VETERINARIO

Comprimidos Nematicida y tenicida para perros

Composición: Cada comprimido contiene:

Prazicuantel	50 mg
Pirantel (embonato)	50 mg
Febantel	150 mg
Excipientes C.S.P.....	1 comprimido

Indicaciones de uso: Tratamiento de parasitosis intestinales de perros producidas por los siguientes parásitos: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum*, *Trichuris vulpis*, *Echinococcus granulosus*, *Taenia hydatigena*, *Dipylidium caninum*.

Contraindicaciones: No administrar a animales extremadamente debilitados.

Reacciones adversas: Los efectos adversos de presentación más frecuente fueron anorexia, letargo, diarrea y vómitos.

Especies de destino: Perros.

Posología para cada especie, modo y vías de administración: En general la posología es de 5 mg de Prazicuantel, 5 mg de Pirantel (embonato) y 15 mg de Febantel por Kg p.v. (equivalente a 1 comprimido/10 Kg p.v.). Ranurado funcional:

Cachorros y perros pequeños:

0,5 - 2 Kg p.v. : 1/4 comprimido

2 - 5 Kg p.v. : 1/2 comprimido

5 - 10 Kg p.v. : 1 comprimido

Perros medianos:

10 - 20 Kg p.v.: 2 comprimidos

20 - 30 Kg p.v.: 3 comprimidos

Perros grandes:

30 - 40 Kg p.v.: 4 comprimidos

No es necesario sobrepasar los 4 comprimidos en perros que pesen más de 40 Kg. Para la desparasitación rutinaria del perro es necesario un único tratamiento. Este será repetido cada tres meses como control rutinario. En zonas con alto riesgo de infestación puede administrarse una dosis repetida a los 14 días del primer tratamiento. Esta repetición de tratamiento es necesaria especialmente en zonas donde no hayan sido eliminados los huéspedes intermedios tales como pulgas, ratones etc.

Precauciones especiales de conservación: Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No conservar a temperaturas superiores a 25°C. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. No usar después de la fecha de caducidad que figura en la caja.

Advertencias especiales: Precauciones especiales para su uso en animales: Para evitar nuevas reinfestaciones, limpiar los sitios de habitación y no administrar alimento casero o desechos a los perros. Administrar alimentos de origen conocido a perros.

Es recomendable administrar el tratamiento inmediatamente antes de la comida. No se necesita ayuno o un régimen alimenticio específico. **Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento a los animales:** No se han descrito. **Sobredosisificación (síntomas, medidas de urgencia, antidotos), en caso necesario:** Dosis superiores a 4 veces la dosis terapéutica pueden producir: trastornos digestivos (náuseas, cólicos, diarreas) que deberán someterse a observación veterinaria. **Uso durante la gestación, la lactancia:** No usar durante las cuatro primeras semanas de la gestación. **Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:** No administrar con fármacos colinérgicos o con propiedades anticolinérgicas, ya que pueden potenciar su toxicidad. No administrar simultáneamente con compuestos de la piperazina. Consulte a su Médico Veterinario. Exclusivamente de uso veterinario.

Precauciones especiales para la eliminación del medicamento veterinario no utilizado o, en su caso, los residuos derivados de su uso: Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas vigentes.

Presentaciones: Caja con 1 blíster de 2 comprimidos. Caja con 1 blíster de 6 comprimidos. Caja con 1 blíster de 10 comprimidos. Caja con 2 blísteres de 10 comprimidos. Caja con 10 blísteres de 10 comprimidos. Caja con 25 blísteres de 10 comprimidos. Es posible que no se comercialicen todos los formatos.

Importado y distribuido por:

LABORATORIOS LAVERLAM S.A.
Cra 5 # 47-165 Cali - Colombia
Reg. ICA No.: 10482 - MV

Elaborado por:



LABORATORIOS CALIER S.A.
C/ Barcelonés, 26 (El Ramassar)
08520 Les Franqueses del Vallés.
Barcelona - España
Dir. Téc.: Gemma Fernández