



CLOXAMBIOTIC

FORMA FARMACÉUTICA:

Combinación antibiótica de aplicación intramamaria durante la lactancia.

COMPOSICIÓN:

Cloxacilina (sódica): 0,20 g

Ampicilina (sódica): 0,075 g

Vehículo c.s. para 1 jeringa: 10 ml.

ACCIÓN:

Antibiótico, antimastítico

En Cloxambiotic se han conjugado dos principios activos, la Cloxacilina, antibiótico bactericida activo sobre bacterias Gram positivas comprendiendo los estafilococos resistentes a la Penicilina, y la Ampicilina, también antibiótico bactericida de amplio espectro y activo sobre bacterias Gram positivas y Gram negativas. La resultante de la asociación de estos dos antibióticos bactericidas, a dosis terapéuticas, es una sinergia que permite tratar con Cloxambiotic las mastitis graves producidas por los distintos tipos de Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Corynebacterium y E. coli, y prevenir el riesgo de instauración de mastitis crónicas.

INDICACIONES:

Está indicado para el control de las mastitis producidas por los siguientes gérmenes: Bacterias Gram (+): Staphylococcus aureus (incluso cepas penicilina-resistentes), Streptococcus spp (incluso enterococos), Corynebacterium pyogenes, Clostridium perfringens, Clostridium pseudotuberculosis, Listeria monocytogenes, Bacillus anthracis. Bacterias Gram (-): Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Salmonella spp, Shigella spp, Proteus mirabilis, Proteus morgani, Brucella spp, Neisseria spp, Bordetella pertussis.

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS:

No administrar a animales con historial de hipersensibilidad a las penicilinas. Animales con historial conocido de alergia a las cefalosporinas deben ser tratados con especial atención. Los animales deben ser tratados al detectarse los primeros síntomas de mastitis, siempre durante el período de lactación.

Después del ordeño a fondo, antes de aplicar el producto, el pezón debe ser lavado con una solución antiséptica. Tras aplicar el producto, dar un masaje a la ubre a fin de mejorar la distribución de la suspensión.

DOSIFICACIÓN:

Bovino: una jeringa de Cloxambiotic por cuarto, cada 12 horas. El tratamiento completo incluye 3 dosis. Ovino y caprino: 1/2 jeringa de Cloxambiotic por cuarto, cada 12 horas. El tratamiento mínimo completo incluye 3 dosis.

ESPECIES:

Bovino, caprino, ovino.

RESTRICCIONES DE USO:

Carne: 7 días. Leche: 3 días.

PRESENTACIÓN:

Jeringa de 10 ml.

