

Calcio-Calier Forte

Solución Inyectable

Especialidad de uso veterinario

COMPOSICIÓN:

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| Borogluconato cálcico (equivalente a 4,6 g de Ca) | 55,28 g |
| Cloruro de Magnesio 6 H ₂ O (equivalente a 0,768 g de Mg) | 6,43 g |
| Hipofosfito magnésico (equivalente a 0,031 g de Mg; 0,08 g de P)..... | 0,338 g |
| Parahidroxibenzoato de metilo sódico..... | 0,1 g |
| Excipientes y estabilizantes, c.s.p..... | 100 ml |

INDICACIONES:

Bovinos: Hipocalcemia aguda, incluyendo la paresia puerperal de la vaca.

ESPECIES DE DESTINO:

Bovinos.

DOSIS, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Vía subcutánea o intravenosa lenta.

7,5 - 22,5 mg de calcio por kg de p.v. (equivalente a 0,16 ml - 0,49 ml de CALCIO-CALIER FORTE / kg p.v.), según la gravedad del proceso.

CONTRAINDICACIONES:

No administrar a animales hiperexcitados, ya que puede ocurrir muerte repentina.

INCOMPATIBILIDADES E INTERACCIONES:

No administrar con tetraciclinas, sulfato de magnesio, bicarbonato sódico y sulfato de estreptomina y de dihidroestreptomina. No administrar junto con glucósidos cardiotónicos.

EFFECTOS SECUNDARIOS:

La inyección subcutánea puede causar necrosis en el punto de inyección.

Se puede producir bradicardia e incluso paro cardíaco si la inyección intravenosa es rápida.

SOBREDOSIFICACIÓN

No exceder la dosis recomendada.

En casos de sobredosis, puede manifestarse arritmia cardíaca, bradicardia y coma. Puede provocarse un bloqueo cardíaco irreversible.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU UTILIZACIÓN:

La inyección intravenosa debe realizarse muy lentamente (6-10 minutos), templando previamente la solución.

Simultáneamente a la administración intravenosa, se debe realizar una auscultación cardíaca; si se desarrollan disritmias o bradicardias graves, debe suspenderse la administración hasta que el latido del corazón vuelva a la normalidad.

Cuando se administre vía SC, se repartirá en varios puntos de inyección (un máximo de 25 ml por punto de aplicación).

Conservar entre 15° y 25°C.

TIEMPO DE ESPERA

Carne: 0 días. Leche: 0 horas.



LABORATORIOS CALIER
DE ARGENTINA, S.A.
Maturin 2745 (C1416CTM)
Capital Federal - Buenos Aires
Argentina, Tel./Fax: (011) 4582-8668

■ SENASA
Cert. N°: 05-235
Estab. Inscripto N° 11.607
D.T. Dr. Marcos Casey
MP N° 7845 Veterinario
Estab. Elab. 8589